Les méthodes de phasage

Aspects théoriques

Claudine MAYER
Université Paris Diderot
Institut Pasteur

université
PARIS
PARIS 7
DIDEROT

U^S-PC
Université Sorbonne
Paris Cité

Institut Pasteur
Unité de Microbiologie Structurale

Introduction et récapitulatifs

- 1. Principe du phasage**
- 2. La fonction de Patterson**
- 3. Le remplacement isomorphe**
- 4. La diffusion anormale**
- 5. Le remplacement moléculaire**

INTRODUCTION ET RECAPITULATIFS

Introduction

2. Relations cristal - image de diffraction - structure

1. PRINCIPE DU PHASAGE

1. Principe du phasage

1.1. Densité électronique et facteur de structure

On a vu que le **facteur de structure** s'exprime en fonction de la **densité électronique**

$$\vec{F}_{hkl} = \int_V \rho(x,y,z) [\exp 2 \pi i (hx + ky + lz)] dv$$

Inversement, on peut montrer que la **densité électronique** s'exprime en fonction **des facteurs de structure** par une relation analogue :

$$\rho_{(x,y,z)} = \frac{1}{V} \sum_h \sum_k \sum_l \vec{F}_{(h,k,l)} \exp[-2\pi \cdot i(hx + ky + lz)]$$

avec $F_{(h,k,l)}$ défini par une amplitude **ET** une phase

C'est la **synthèse de Fourier** de la densité électronique

1. Principe du phasage

1.1. Densité électronique et facteur de structure

$$\vec{F}_{(h,k,l)} = \sum_{j=1}^{\text{atoms}} f_{(j)} \exp[2\pi \cdot i(hx_{(j)} + ky_{(j)} + lz_{(j)})]$$

$$\vec{F}_{hkl} = A + iB = |F|e^{i\phi}$$

$$|F(hkl)| = |F(-h-k-l)|$$

1. Principe du phasage

1.4. Principe des méthodes de phasage

- La connaissance de F_{hkl} en module et en phase est une **condition indispensable** au calcul de $\rho(xyz)$, donc à la résolution de la structure
 - L'expérience conduit au module du facteur de structure (intensité des taches du cliché de diffraction) mais ne conduit pas à la phase
- ➔ L'objectif des méthodes de résolution est de **déterminer les phases** des facteurs de structures

1. Principe du phasage

1.4. Principe des méthodes de phasage

$$\rho(x,y,z) = TF^{-1} (F(h,k,l))$$

$$\rho_{(x,y,z)} = \frac{1}{V} \sum_h \sum_k \sum_l \vec{F}_{(h,k,l)} \exp[-2\pi \cdot i(hx + ky + lz)]$$

Facteurs de Structure (module, phase)

Données de diffraction traitées
= liste des réflexions (h,k,l)

1	1	0	157984.0	1667.2
2	1	0	32571.8	836.2
3	1	0	28649.7	855.3
4	1	0	21480.3	767.4
5	1	0	8201.6	590.4
6	1	0	272377.2	3366.9
.....				

Données de diffraction brutes

avec

$$F_{hkl} = |F_{hkl}| e^{i\alpha_{hkl}}$$

$|^{1/2}$

truncate
xdconv

**Méthodes indirectes
= estimation**

1. Principe du phasage

1.4. Principe des méthodes de phasage

Les méthodes reposent sur une propriété remarquable de la série de Fourier : **sa convergence**

- Connaissant approximativement un certain nombre de phases, une première synthèse de Fourier fait apparaître des atomes de la structure
- On peut ainsi déduire de nouvelles phases et améliorer les phases de départ, une deuxième synthèse de Fourier fait apparaître d'autres atomes
- On recommence le cycle

1. Principe du phasage

1.5. L'importance des phases

<http://www.yorvic.york.ac.uk/~cowtan/fourier/fourier.html>

0° = rouge
 120° = vert
 240° = bleu

Module = intensité
Phase = couleur

Dr Kevin Cowtan
York Structural Biology
Laboratory, Department
Of Chemistry
University of York

1. Principe du phasage

1.5. L'importance des phases

Modules du canard et
phases du chat

intensité canard
couleur chat

Modules du chat et
phases du canard

1. Principe du phasage

1.5. L'importance des phases

2 objets sont similaires

Les TF sont similaires

Dans le cas de cristaux : il faut que les cristaux soient **isomorphes** (mêmes paramètres de maille, même groupe d'espace, même orientation dans l'ua)

Ce principe de base est utilisé :

- dans le phasage par remplacement moléculaire
- dans l'étape d'affinement

1. Principe du phasage

1.5. L'importance des phases

Lorsque 2 structures sont similaires, on peut combiner les modules

Modules du chat et
phases du Manx

2 x M(chat) - M(manx) et
phases du Manx

M(chat) - M(manx) et
phases du Manx ??

1. Principe du phasage

1.6. Les différentes méthodes

1. Principe du phasage

1.6. Les différentes méthodes

1. Les méthodes directes

- petites molécules
- en phase de développement pour les macromolécules

2. Le remplacement isomorphe

- cristal natif et cristaux de dérivés lourds
- SIR, MIR, SIRAS

PHASES

4. Le remplacement moléculaire

- nécessité d'une structure homologue disponible (PDB)
- peut être rapide

3. La diffusion anormale

- cristal avec diffuseurs anomaux
- SAD, MAD

1. Principe du phasage

1.7. Choix de la méthode à utiliser

Recherche d'homologues dans les banques protéiques

1. Principe du phasage

1.8. Remarque sur les méthodes directes

Autre nom : méthodes *ab initio*

Méthode encore peu utilisée mais en développement

→ Applicable pour :

- Des structures d'environ 1000 atomes (max 2000)
- Résolution atomique ($d < 1.2 \text{ \AA}$)
- Quelques cas à $2.0 \text{ \AA}$ de résolution

G. Bricogne « phasage *ab initio* »
Methods in Enzymology, vol 277 (1997)

Les phases sont directement déterminées à partir des amplitudes observées grâce à des relations mathématiques existant entre les phases (à partir de valeur initiales, déduction d'autres valeurs)

Ces relations existent si la densité électronique est :

(1) partout positive $\rho(r) \geq 0$

positivité

(2) composé d'atomes discrets

atomicité

→ Autre application

Détermination de la « sous-structure » des atomes lourds ou des diffuseurs anomaux

SHELXD

SnB

ACORN

2. LA FONCTION DE PATTERSON

2. La fonction de Patterson

2.1. Définition

➔ Après le traitement de données, on ne dispose pas des phases

Quelle est la transformée de Fourier des intensités mesurées ?

$$\text{TF}(I_{h,k,l}) = \text{TF}(\vec{F}_{h,k,l} \cdot \vec{F}_{-h,-k,-l}) = \rho(\vec{r}) * \rho(-\vec{r}) = \text{Fonction de Patterson}$$

$$P(uvw) = 1/v \sum_h \sum_k \sum_l |F_{hkl}|^2 \exp(-2\pi i (hu + kv + lw))$$

Or $|F_{hkl}|^2 = |F_{-h-k-l}|^2$ $P(uvw) = 1/v \sum_h \sum_k \sum_l |F_{hkl}|^2 \cos(2\pi (hu + kv + lw))$

La fonction de Patterson est la transformée de Fourier des intensités

Fonction 3D dont les maxima correspondent à tous les vecteurs interatomiques définis sur les atomes de la maille (u,v,w)

2. La fonction de Patterson

2.1. Définition

L'intensité des pics est proportionnel au numéro atomique des atomes dont provient ce pic ($Z_i Z_j$)

Nombre de pics dans la fonction de Patterson

N atomes	Nombre total de pics	N^2	9
	Nombre de pics à l'origine	N	3
	Nombre de pics « non-origine »	$N(N-1)$	6
	Nombre de pics uniques	$N(N-1)/2$	3

Remarque

1000 atomes

499 500 pics !!

2. La fonction de Patterson

2.1. Définition

Autre écriture

$$P(u,v,w) = \int_r \rho(x,y,z) \rho(x+u, y+v, z+w) dv$$

- ➔ La fonction $P(u,v,w)$ a des valeurs significatives seulement si (u,v,w) est un vecteur interatomique
- ➔ Valeur moyenne, sur une période, du produit des densités électroniques séparées par un vecteur (u,v,w)
- ➔ Une valeur élevée de $P(u,v,w)$ est observée si, quelque part dans la maille, des maxima de densité sont séparés par un vecteur (u,v,w)
- ➔ **Inversement**, $P(u,v,w)$ atteint un maximum dès que le vecteur (u,v,w) relie 2 maxima de la densité électronique

2. La fonction de Patterson

2.1. Propriétés de la fonction de Patterson

- (1) La fonction de Patterson est toujours **centrosymétrique**

$$U_{i,j} = -U_{j,i}$$

- (2) La symétrie de la fonction de Patterson est fonction du groupe d'espace de la structure considérée

Exemple	axe 2	$I(h,k,l) = I(-h,k,-l)$
		$P(u,v,w) = P(-u,v,-w)$

- (3) Les éléments de symétrie translatrice (axes hélicoïdaux) de la maille cristalline engendrent une symétrie de rotation

Exemple	axe 2_1	2 points équivalents dans le RD	
	(x,y,z) et $(-x,y+1/2,-z)$		$I(h,k,l) = I(-h,k,-l)$
			$P(u,v,w) = P(-u,v,-w)$

2. La fonction de Patterson

2.1. Propriétés de la fonction de Patterson

2. La fonction de Patterson

2.1. Propriétés de la fonction de Patterson

2. La fonction de Patterson

2.1. Applications de la fonction de Patterson

(1) Patterson native

On observe un pic dès que 2 molécules sont reliées par translation

- mode de réseau

exemple mode C

on observe un pic en $\frac{1}{2} \frac{1}{2} 0$

- si 2 molécules de l'unité asymétrique sont reliées par une translation

(2) Patterson isomorphe $F^2_{PH} - F^2_P = \Delta F_{iso}$

Localisation des positions des atomes lourds dans la maille (IV.5.1)

(3) Patterson anormale $(F_+ - F_-)^2 = \Delta F_{ano}$

Localisation des positions des atomes anormaux dans la maille (IV.5.2)

(4) Fonction de rotation *self-rotation et cross-rotation*

Localisation des symétries de rotation (direction)

2. La fonction de Patterson

2.1. Applications de la fonction de Patterson

(1) Patterson native

Maille du cristal

2 pics symétriques correspondant à la translation

2 molécules reliées par translation
⇒ grand nombre de vecteurs tous identiques

Carte de Patterson

2. La fonction de Patterson

2.1. Applications de la fonction de Patterson

(4) Fonction de rotation

$$R(\alpha, \beta, \gamma) = \int_{\mathbf{u}} P_2(\mathbf{u}) P_{1r}(\mathbf{u}_r) d\mathbf{u}$$

$P(\mathbf{u})$ fonction de Patterson

$P_r(\mathbf{u}_r)$ fonction de Patterson après rotation

La fonction $R(\alpha, \beta, \gamma)$ présente un maximum lorsque les 2 fonctions de Patterson se superposent

(1) Fonction de self-rotation

P_1 et P_2 calculées à partir du même cristal

(2) Fonction de cross-rotation

P_1 calculée à partir du cristal 1
 P_2 calculée à partir du cristal 2

2. La fonction de Patterson

2.1. Propriétés de la fonction de Patterson

(4) Fonction de rotation

Self-rotation

Localisation des axes de symétrie

Un code d'orthogonalisation positionne (xyz) par rapport à la maille

(x y z) selon (a, c* $\wedge$ a, c*)

Représentation par des projections stéréographiques

ω et Φ positionnent l'axe K
K définit l'angle de rotation

Cross-rotation

Remplacement moléculaire : orientation du modèle

2. La fonction de Patterson

2.1. Propriétés de la fonction de Patterson

(4) Fonction de rotation

Exemple

$\text{Kappa} = 180^\circ$

Axe 2

Axe 7

$\text{Kappa} = 52^\circ$

Groupe d'espace P1
4 molécules dans
l'unité asymétrique

3. LE REMPLACEMENT ISOMORPHE

3. Le remplacement isomorphe

3.1. Principe de la méthode

Il est basé sur le changement d'intensité causé par la présence d'un atome lourd dans la molécule (F_H , φ_H)

La méthode consiste à « marquer » la macromolécule dans le cristal par des atomes lourds

- Brome ou iode pour les acides nucléiques
- Gaz rares (Xe, Kr), Plomb, mercure, lanthanides... pour les protéines

Atome lourd

cristal dérivé

F_{PH}

=

cristal natif

F_P

+

« cristal différence »
cristal virtuel

F_H

Heavy

3. Le remplacement isomorphe

3.1. Principe de la méthode

Hypothèse de base les cristaux de la structure native et du dérivé lourd doivent être **isomorphes**

Pour chaque réflexion hkl

$$\vec{F}_{hkl} = \underbrace{\sum_P f_P e^{2\pi i (hx_P + ky_P + lz_P)}}_{|F_P| e^{i\phi_P}}$$

$$\vec{F}_P$$

$$\vec{F}_{hkl} = \underbrace{\sum_P f_P e^{2\pi i (hx_P + ky_P + lz_P)}}_{|F_P| e^{i\phi_P}} + \underbrace{\sum_H f_H e^{2\pi i (hx_H + ky_H + lz_H)}}_{|F_H| e^{i\phi_H}}$$

$$\vec{F}_{PH} = \vec{F}_P + \vec{F}_H$$

F_{PH} = facteur de structure du cristal dérivé

F_H = facteur de structure des atomes lourds

F_P = facteur de structure de la protéine

3. Le remplacement isomorphe

3.2. Principe de la détermination des phases

Construction de Harker

On dispose de

- module de F_P
- module et phase de F_H
- module de F_{PH}

$$F_P ? \text{ tels que } F_{PH} = F_P + F_H$$

SIR

Single Isomorphous Replacement
1 cristal natif + 1 seul cristal dérivé

3. Le remplacement isomorphe

3.2. Principe de la détermination des phases

Avec un deuxième dérivé,
on lève l'ambiguïté de phase

MIR

Multiple Isomorphous Replacement
1 cristal natif + plusieurs cristaux dérivés (≥ 2)

3. Le remplacement isomorphe

3.3. Les différentes étapes

- ➔ Préparation des cristaux de dérivés lourds
- ➔ Enregistrement espaces complets de diffraction
 - de la structure native
 - du (des) dérivé(s) lourd(s)
- ➔ Mise à l'échelle des jeux natif/dérivé(s)
- ➔ Détermination de la position des atomes lourds
- ➔ Affinement des paramètres (x, y, z, q, B) des atomes lourds
- ➔ Calcul des phases (probabilité de phases)
- ➔ Calcul d'une carte de densité électronique

3. Le remplacement isomorphe

3.4. Obtention des dérivés lourds

- Par trempage des cristaux
Les composés lourds diffusent dans le cristal à travers les canaux de solvant
Ils peuvent se fixer sur des sites précis
 - Ex : composés Hg réagissent avec les Cys accessibles et réduites à pH neutreCette étape est souvent longue et fastidieuse
- Co-cristallisation
- Modification de la macromolécule
 - Brome ou iode pour les acides nucléiques
 - Sélénométhionine cf diffusion anormale

cf. COURS ALAIN

Pike AC et al, An overview of heavy-atom derivatization of protein crystals
Acta Cryst D, 72, 303-18 (2016)

3. Le remplacement isomorphe

3.5. Défaut d'isomorphisme

L'incorporation de l'atome lourd ne doit pas trop perturber l'empilement cristallin

$$R_{iso} = \frac{\langle ||F_{PH}| - |F_P|| \rangle}{\langle |F_P| \rangle} = \sqrt{\frac{N_H}{2}} \frac{f_H}{\langle |F_P| \rangle}$$

$$\left\langle \frac{\Delta I}{I} \right\rangle = \sqrt{\frac{N_H}{2N_P}} \frac{f_H}{f_P}$$

Pour 1000 atomes, l'incorporation d'un atome Hg change l'intensité de 25%
Mais un changement d'isomorphe par un changement de 0.5% des paramètres de mailles ou de la rotation de 0.5° de la molécule dans l'unité asymétrique change les intensités de 15% ...

Pour une protéine, une valeur approchée de $\langle |F_P| \rangle$ en e⁻ peut être calculée par:

$$\frac{6,7 \times \sqrt{NA}}{\sqrt{346 \times NR}} \\ \sqrt{3,14 \times MM}$$

NA: nombre atomes

NR: nombre de résidus

MM: masse moléculaire

Le défaut d'isomorphisme augmente avec la résolution

En général : Le cristal dérivé est isomorphe dans la zone de résolution où R_{iso} reste constant

3. Le remplacement isomorphe

3.6. Détermination de la position des atomes lourds

Fonction de Patterson

$$P(uvw) = \sum (\Delta |F|_{iso})^2 \cos(2\pi(hu + kv + lw))$$

avec $\Delta |F|_{iso} = |F_{PH}| - |F_P|$ $(\Delta |F|_{iso})^2 \sim |F_H|^2$

Calculée sur les données de diffraction issues de 2 cristaux (natif et dérivé)

Fonction de Patterson définissant une carte dont les pics sont les vecteurs interatomiques entre atomes lourds « uniquement »

Section de Harker

Méthodes directes

- Calcul des phases (probabilité de phases)
- Calcul de la densité électronique

SHELXD

3. Le remplacement isomorphe

3.6. Détermination de la position des atomes lourds

Section de Harker

Les éléments de symétrie de la maille cristalline peuvent engendrer des pics dans certains plans ou sections particulières

➔ Coordonnées des vecteurs interatomiques entre 2 mêmes atomes reliés par symétrie

Exemple : groupe d'espace $P2_1$ (2 positions équivalentes)

	x y z	-x y+1/2 -z
x y z	0 0 0	-2x +1/2 -2z
-x y+1/2 -z	2x -1/2 2z	0 0 0

$$U = \pm 2X \quad v = \pm 1/2 \quad w \pm 2Z$$

Les pics correspondants appartiennent tous à un plan

$$v = 1/2$$

SECTION DE HARKER

2 pics

↕
1 atome

Carte des vecteurs interatomiques en $v = +1/2$

3. Le remplacement isomorphe

3.6. Détermination de la position des atomes lourds

La section de Harker dépend du groupe d'espace

pas de symétrie	pas de section de Harker
axe de rotation selon b	section de Harker en $v = 0$
axe de rotation selon c	section de Harker en $w = 0$
axe hélicoïdal 2_1 selon b	section de Harker en $v = 1/2$
axe hélicoïdal 3_1 selon c	section de Harker en $w = 1/3$
axe hélicoïdal 4_1 selon c	section de Harker en $w = 1/4$
etc ...	

3. Le remplacement isomorphe

3.7. Probabilité de phases

Sources d'erreurs

- Paramètres (x,y,z,q,B) des atomes lourds
- Amplitudes des F mesurés (F_P et F_{PH})
- Mise à l'échelle
- Défaut d'isomorphisme

Erreur de fermeture

hypothèse : $F_{PH} + \epsilon$

$$\epsilon = |F_{PH_{obs}}| - |F_{PH_{calc}}| = |F_{PH_{obs}}| - [|F_P| e^{i\phi_P} + |F_H| e^{i\phi_H}]$$

Les erreurs sont traitées avec des méthodes statistiques

Distribution de **probabilité de phase**

$$P(\alpha) = Ne^{\frac{-\epsilon^2}{2E^2}} \quad \text{avec} \quad E = \left\langle \left| F_{PH(obs)} - F_{PH(calc)} \right|^2 \right\rangle$$

Hypothèse

3. Le remplacement isomorphe

3.7. Probabilité de phases

SIR

$$m = \cos \Delta\phi$$

La qualité de l'information sur chaque phase est mesurée par la **figure de mérite** (m ou fom) qui est le reflet de l'étroitesse de la distribution de probabilité

- $m = 1$: distribution étroite
- $m = 0$: distribution plate

MIR

Distribution unimodale

les probabilités de phase des différents dérivés sont multipliées

Calcul de la carte de densité électronique contenant le moins d'erreur

- module $F_{\text{best}} = m F_P$
- phase ϕ_{best}

4. LA DIFFUSION ANOMALE

4. La diffusion anormale

4.1. Principe de la méthode

Il est basé sur la modification de la diffraction lorsqu'un ou plusieurs diffuseurs anormaux sont présents dans le cristal

Différence d'intensité d'une paire de Bijvoet lorsque la loi de Friedel n'est plus respectée

Correction par rapport à la diffusion d'un électron libre

Voir diapo suivante

Pour les atomes anormaux
 $f_a = f_a^o + f'_a + i f''_a$

On pose $f_a = f_a^o + f'_a$

$$F = \sum f_p e^{i\phi_p} + \sum (f_a + i f''_a) e^{i\phi_a}$$
$$F = \sum f_p e^{i\phi_p} + \sum f_a e^{i\phi_a} + i \sum f''_a e^{i\phi_a}$$
$$F = F_p + F_a + i F''_a$$

La loi de Friedel n'est plus respectée

4. La diffusion anormale

4.1. Principe de la méthode

Dans la plupart des cas, f' et f'' sont négligeables (modèle de l'électron libre)

SAUF lorsque $\lambda_{\text{incident}} \approx \lambda_{\text{seuil}}$ cad aux longueurs d'ondes correspondant à l'énergie nécessaire pour extraire des électrons d'une couche électronique donnée (K, L_I, L_{II}, L_{III})

Pour $\lambda_{\text{incident}} \approx 1 \text{ \AA}$, seuls les atomes lourds présentent une absorption non négligeable

Le facteur de diffusion devient un nombre complexe

$$f_a = f'_a + f''_a + i f''_a$$

Variation de f en fonction de la longueur d'onde

Variation de f en fonction de la résolution

f' et f'' sont fonction de la longueur d'onde
Mais ne sont pas fonction de la résolution (concerne les e⁻ proches du noyau donc indépendants de $\sin\theta$)
Valeurs de $\Delta f(f')$ et f'' tabulées dans les Tables Internationales

4. La diffusion anormale

4.2. Principe de la détermination des phases

Les termes dépendants et indépendants de la longueur d'onde peuvent être séparés

$$\vec{F}_T(\lambda) = \vec{F}_T(h) + \vec{F}_A(\lambda)$$

Résolution de N équations à 4 inconnues à plusieurs longueurs d'ondes

Le problème des phases a une solution analytique

MAD : Multiple Anomalous Dispersion

- 3 longueurs d'onde : 1. f'' max 2. f' max
- 3. loin du seuil d'absorption

SAD : Single Anomalous Dispersion

- 1 longueur d'onde (f'' maximal)

4. La diffusion anormale

4.3. Les différentes étapes

- ➔ Production et cristallisation de la protéine modifiée
- ➔ Détermination de la longueur d'onde pour laquelle le signal anormal est maximal

Mesure d'un spectre de fluorescence du cristal

- ➔ Enregistrement d'espaces complets ET redondants
 - A partir d'un seul cristal
- ➔ Détermination de la position des diffuseurs anomaux
- ➔ Affinement des paramètres des diffuseurs anomaux
- ➔ Calcul des phases sous la forme de probabilité de phases
- ➔ Calcul d'une carte de densité électronique

4. La diffusion anormale

4.4. Méthodologie

→ Introduction de diffuseurs anomaux dans le cristal ou directement dans la protéine

- Atomes lourds
- Développements de cette technique : utilisation de la sélénométhionine

→ Mesure d'un spectre de fluorescence

- Peak, inflection

λ_{peak}

$\lambda_{\text{inflection}}$

→ Collecte des données anormales

- Mesurer avec précision les paires de Bijvoet
 - Inverse beam (rotation de 180° entre chaque image) : paires mesurées sur images consécutives
 - Orientation du cristal : paires sur la même image

4. La diffusion anormale

4.4. Méthodologie

→ Introduction de diff.

da

- A
- D

→ Mes

- Pe

→ Collec

- Mesu

- I

c

- Orientation du cristal : paires sur la même image

<http://skuld.bmsc.washington.edu/scatter/>

(image) : paires mesurées sur images

4. La diffusion anormale

4.4. Méthodologie

→ Introduction de diffuseurs anomaux dans le cristal ou directement dans la protéine

- Atomes lourds
- Développements de cette technique : utilisation de la sélénométhionine

→ Mesure d'un spectre de fluorescence

- Peak, inflection

λ_{peak}

$\lambda_{\text{inflection}}$

→ Collecte des données anormales

- Mesurer avec précision les paires de Bijvoet
 - Inverse beam (rotation de 180° entre chaque image) : paires mesurées sur images consécutives
 - Orientation du cristal : paires sur la même image

4. La diffusion anormale

4.5. Détermination de la position des atomes anomaux

Fonction de Patterson

$$P(uvw) = \sum (\Delta |F|_{\text{ano}})^2 \cos(2\pi(hu + kv + lw))$$

avec

$$\Delta |F|_{\text{ano}} = |F_{hkl}| - |F_{-h-k-l}| \quad \Delta F_{\text{ano}} \approx \sum \Delta F''$$

Calculée sur les données de diffraction
issue d'un seul cristal

Fonction de Patterson définissant une carte dont les pics sont les vecteurs interatomiques entre atomes anomaux « uniquement »

Section de Harker

Méthodes directes

- Calcul des phases (probabilité de phases)
- Calcul de la densité électronique

SHELXD

4. La diffusion anormale

4.6. Avantages et inconvénients

Avantages

- Pas de défaut d'isomorphisme (1 seul cristal nécessaire)
- pas de problème d'occupation (sélénométhionine, ou tout diffuseur anomal lié covalamment, est un point d'ancrage pour la construction de la structure)
- Phasage à haute résolution

Inconvénients

- Signal anomal faible par rapport aux intensités collectées
 - il faut 1 Me pour 8 kDa
- L'accès aux sources synchrotron est nécessaire
 - utilisation de Gd sur anode tournante

4. La diffusion anormale

4.3. Combinaison remplacement isomorphe et diffusion anormale

SIRAS

Principe de la méthode SIRAS

- 1 cristal natif
- 1 cristal dérivé contenant des atomes lourds qui sont diffuseurs anomaux

MIRAS

5. LE REMPLACEMENT MOLECULAIRE

5. Le remplacement moléculaire

5.1. Principe de la méthode

RAPPEL Dans le cas des protéines
Lorsque l'identité de séquence > 25 % les séquences sont dites homologues
cad elles possèdent un ancêtre commun
DONC les structures sont similaires

Hypothèse de base La structure d'un homologue est connue

Propriétés de la Transformée de Fourier

Si le modèle et la structure inconnue sont **similaires** et sont **placés et orientés** de la même manière dans une **maille** présentant les mêmes caractéristiques (paramètres, symétrie)

ALORS

$$F_{\text{mod}}, \varphi_{\text{mod}} \approx F_{\text{struct}}, \varphi_{\text{struct}}$$

manx

chat

On peut utiliser les phases φ_{mod} à la place de φ_{struct}

5. Le remplacement moléculaire

5.1. Principe de la méthode

Homologue de structure connue = Modèle de départ

Orienter et positionner cette structure modèle dans la maille du cristal étudié

5. Le remplacement moléculaire

5.2. Pré-requis

Concernant le modèle

Plusieurs origines possibles

- la même protéine résolue dans un autre groupe d'espace
- la protéine mutée ou en complexe, et vice versa

- une protéine homologue
- un domaine de la protéine

- un domaine homologue à l'un des domaines de la protéine
- un modèle construit à partir de prédiction de structure

- une structure « poly-Ala »

5. Le remplacement moléculaire

5.2. Pré-requis

Concernant la composition de la maille

⇒ Coefficient de Matthews V_m

⇒ Pourcentage de solvant

$$\% \text{ de solvant} = 1 - \frac{1.23}{V_m}$$

% de volume occupé par les protéines

$$V_m = \frac{\text{Volume de la maille}}{Z \times N \times MW}$$

Volume total occupé
par 1 Da ($\text{\AA}^3/\text{Da}$)

Volume
occupé par la
protéine

Volume occupé
par le solvant

1,23 $\text{\AA}^3/\text{Da}$ = Volume moyen occupé par 1 Da de protéine

<http://www.ruppweb.org/mattprob/default.html>

```
MATTPROB - MATTHEWS PROBABILITY and SOLVENT CONTENT ESTIMATES
-----
The selected method is parameterized fit to binned 2013 data
(C) 2003-2013 C.X. Weichenberger, K. Kantardjiev and B. Rupp
-----
Unit cell dimensions in A, deg(o) and cubic A :
-----
a          b          c          alpha    beta     gamma    volume
84.30     98.78     43.90     90.00    90.00    90.00    365562.1
-----
Space group P 21 21 21 , space group number 19, Laue class mmm , z= 4
-----
System as decoded from unit cell dimensions : orthorhombic
is consistent with space group P 21 21 21 : orthorhombic
Unit cell volume is      : 365562.1 A**3
Asymmetric unit volume is : 91390.5 A**3
-----
Found 1 possible solutions :
-----
Vm of protein (Matthews coeff.) is 2.51 A**3/Dalton
Estimated solvent content is 54.94 %
-----
N(mol)      Prob(N)      Prob(N)      Vm          Vs          Mw
for resolution overall      A**3/Da     % solvent   Da
-----
1           1.0000     1.0000     2.51        54.94      36440.00
-----
The return URL for the image below is: http://www.ruppweb.org/write/GVY.gif
```

5. Le remplacement moléculaire

5.3. Procédure

⇒ Approche utilisant la fonction de Patterson

1. Calculer les fonctions de Patterson
 - pour le modèle (maille P_1 avec des paramètres de maille très grands) P_1
 - des données de diffraction (F_{obs}) P_2
2. Orienter (rotation) le modèle en utilisant les vecteurs interatomiques intramoléculaires pour les fonctions de Patterson
 - maximum de corrélation de la **fonction de rotation**
3. Positionner la molécule orientée en utilisant les vecteurs interatomiques intermoléculaires pour les fonctions de Patterson
 - maximum de corrélation pour la **fonction de translation**
4. **La position avec le meilleur score est la solution**

MOLREP

AMORE

PHASER

Fonction de score basée sur la méthode de maximum de vraisemblance

5. Le remplacement moléculaire

5.3. Procédure

Fonction de rotation

The diagram shows a 3D unit cell for a P1 space group. It is a rectangular prism with a grid of points at the corners. Eight molecules are positioned at these grid points. Each molecule is a complex, multi-colored structure. A black arrow points to one of the molecules in the top row, labeled 'molécule'. A green dot is located at the bottom-left corner of the unit cell, labeled '(000)'. The text 'Maille P1 = pas de symétrie' is written at the bottom left of the diagram area.

molécule

(000)

Maille P1 = pas de symétrie

Maille P1 très grande :

Distinction vecteurs intermoléculaires et intramoléculaires dans le calcul de la fonction de Patterson

$$R(\alpha, \beta, \gamma) = \sum_{\text{intra}} P_2(\mathbf{u}) P_{1r}(\mathbf{u}_r)$$

$R(\alpha, \beta, \gamma)$ est maximale lorsque les 2 fonctions de Patterson se superposent

5. Le remplacement moléculaire

5.3. Procédure

Fonction de translation

$$(xyz)_{\text{struct}} \approx (xyz)'_{\text{mod}} = [C].(xyz)_{\text{mod}} + \textcircled{t}$$

Molécule orientée placée à l'origine selon (α, β, γ) trouvées par la fonction de rotation

$$T(u, v, w) = \sum_{\text{inter}} P_2(u) P_{1r}(u_t)$$

Les vecteurs intramoléculaires de P_2 et P_{1r} sont identiques et sont éliminés par soustraction

$T(u, v, w)$ est maximale lorsque les 2 fonctions de Patterson se superposent

Maille cristalline de la structure inconnue

5. Le remplacement moléculaire

5.3. Procédure

Fonction de rotation

5. Le remplacement moléculaire

5.6. Avantages et inconvénients

Avantages

- ne nécessitant qu'un seul espace de diffraction
- ne nécessitant pas l'étape de construction du modèle
- rapide en cas de succès

Inconvénients

- le succès de la méthode dépend
 - du taux de similarité structurale entre la protéine connue et la protéine étudiée
 - de la « forme » de la protéine (globulaire ou allongée)
 - très sensible aux basses et hautes résolutions

Conclusion

$|^{1/2}$

Données de diffraction

$F(h,k,l)$

$\phi(h,k,l)$

Estimées par l'une
des méthodes

$\rho(x,y,z)$

Calculée sur l'unité
asymétrique

$m F_P, \phi_{\text{best}}$

Interprétable ?? Améliorable ??